



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

**S.R.P.V. POITOU – CHARENTES**

Bulletin technique n° 16 du 31 Mai 2007 (1 page)

## Grandes Cultures

**COLZA :** stade G4

La surveillance peut être suspendue.  
Les traitements sont maintenant inutiles.

**POIS :** stade gousses pleines à début jaunissement**Tordeuses**

Le vol continue, mais les captures de juin sont sans conséquence néfaste.  
Les traitements sont maintenant inutiles.

**BLE :** stade grain aqueux à laiteux**Maladies**

La **rouille brune** continue sa progression en variétés sensibles insuffisamment protégées.  
Ne plus intervenir.

**Pucerons**

Ils sont très rares sur épis, les conditions climatiques sont défavorables au vol depuis une semaine.

En situations précoces, le stade limite de sensibilité va être atteint rapidement.

Maintenir la surveillance surtout en situations tardives, si la météo redevient plus favorable.

**MAÏS :** stade 2 à 10 feuilles**Sésamie - Pyrale**

Les captures de **sésamie** se poursuivent à un rythme plus faible depuis une semaine en raison des conditions climatiques. (Une cinquantaine de captures sur une dizaine de pièges).

Le vol de la **pyrale** s'est également ralenti avec 3 à 5 captures par piège en Vienne et Charente sur la même période. Des **pontes** sont observées en Vienne mais la fréquence de pieds porteurs est faible.

Les températures fraîches et les passages pluvieux fréquents conduisent à moduler les préconisations initiales :

◆ **Secteurs où la sésamie est prioritaire :**

⇒ Stratégie à **2 applications** à demie-dose : Pour les parcelles non protégées, intervenir dès que possible, au plus tard le 4-5 juin, dans la mesure où le renouvellement du traitement sera compatible avec le stade de la culture...

⇒ Stratégie à **application unique** : l'intervention est à prévoir du 06 au 09 juin.

◆ **Secteurs où la pyrale est prioritaire :**

⇒ Dans les situations où la sésamie est également prise en compte, la première intervention à demie-dose à base de pyrèthrinoides est à effectuer rapidement.

⇒ Pour la stratégie à intervention unique contre la pyrale, ne pas intervenir dans l'immédiat. Pour l'instant on s'orienterait vers la période du 10 au 15 juin (à préciser dans le prochain bulletin).

**TOURNESOL :** stade 2 paires de feuilles à E1**Pucerons**

Les faibles populations stagnent : ces ravageurs sont présents sur 10 à 30 % des plantes, leur nombre par plante reste très faible (2 à 10).

Surveiller les situations tardives dès le retour de conditions climatiques plus favorables.

**Phomopsis**

Le choix de variétés **très peu sensibles** (TPS) permet de limiter le risque d'attaques susceptibles d'affecter le rendement de la culture. Comme l'an dernier, une protection fongicide ne sera envisagée que pour des **situations particulières**, c'est-à-dire dans des secteurs à haut potentiel (Nord Vienne, Terres de Champagne en Sud Charentes).

Des précisions complémentaires (évolution du risque...) figureront dans les prochains bulletins.

**BLE**

**Pucerons :**  
Situations très calmes

**MAÏS**

**Pyrale-Sésamie :**  
Vols irréguliers

Raisonner les interventions

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
Service Régional de la Protection des Végétaux  
13 Route de la forêt  
86580 BIAUD  
Tél : 05 49 62 98 25  
Fax : 05 49 62 98 26

Directrice gérante :  
S. DUTARTRE

Site internet : [www.srpv-poitoucharentes.com](http://www.srpv-poitoucharentes.com)  
E-mail : [srpv.draf-poitoucharentes@agriculture.gouv.fr](mailto:srpv.draf-poitoucharentes@agriculture.gouv.fr)  
Publication périodique  
C.P.P.A.P. n°1664-AD  
ISSN n°0294-4693

D340 J 40830

777